

Amanita ovoidea

Amanite ovoïde (boulet blanc)

Ordre : Agaricales Genre : Amanita
Sporée : Blanche



Chapeau

De 10 à 25 cm de diamètre, jusqu'à 40cm. Blanc, ivoirin, lisse, appendiculé de lambeaux de voile partiel comme une marge excédentaire crémeuse. Marge non striée.

Zoom

Chair

Blanche et épaisse. Odeur de marée quand il vieillit.

Zoom

Hyménophore

Lames blanches à crèmes, libres. Arêtes floconneuses, fertiles, peu serrées.

Zoom

Pied

Blanc, très trapu, floconneux, légèrement radicant-conique.

Zoom

Anneau

Blanc, crémeux et fugace qui se confond vite avec le pied.

Zoom

Volve

Blanche à crème, en sac, large.

Zoom

Amanita ovoidea

Amanite ovoïde (boulet blanc)

Ordre : Agaricales Genre : Amanita
Sporée : Blanche



Habitat

Sur sol calcaire, sous feuillus et conifères.

Comestibilité

Comestible.



Période de cueillette

Du mois de Juillet jusqu'à Novembre.
Eté et automne.

Remarque

Comestible moyen, plus apprécié pour sa taille que pour sa saveur. Attention à la grande confusion avec *Amanita proxima*. Dans tous les cas où la totalité du pied n'a pas été ramassé, difficile, voire impossible de conclure, car voile partiel fragile, et voile général caractéristique.

Amanita ovoidea

Amanite ovoïde (boulet blanc)

Ordre : Agaricales Genre : Amanita
Sporée : Blanche

Confusions avec risques



Confusions sans risques

