

# Amanita pachyvolvata



## Amanite à volve épaisse

Ordre : Agaricales    Genre : Amanita  
Sporée : Blanche

### Chapeau

De 5 à 15 cm de diamètre. Hémisphérique jeune puis plan-convexe à maturité. Revêtement légèrement visqueux, ochracé à gris brunâtre foncé. Marge nettement striée, plus claire, brune, jaunâtre.

Zoom

### Chair

Chair blanche. Saveur non significative et odeur fongique.

Zoom

### Hyménophore

Lames assez larges blanches à blanc crème jeune puis légèrement blanc jaunâtre. Arêtes finement fimbriées.

Zoom

### Pied

Sub-cylindrique avec la partie inférieure plus large, chiné de gris ochracé.

Zoom

### Sans anneau

Zoom

### Volve

Très épaisse de 2 à 4 mm, charnue, blanche à ochracé très clair

Zoom

# Amanita pachyvolvata

## Amanite à volve épaisse

Ordre : Agaricales      Genre : Amanita  
Sporée : Blanche

### Habitat

Sous conifères.



### Comestibilité

Comestible sous condition, lire la rubrique remarque.



### Période de cueillette

Du mois de Juin jusqu'à Novembre.

### Remarque

Comme les autres espèces du sous-genre Amanitopsis, elle nécessite une cuisson à 70°C pour détruire les hémolysines présentes (des glycoprotéines thermolabiles) qui peuvent conduire à une insuffisance rénale aiguë. Lors de la récolte, il est important de la séparer des autres champignons comestibles qui pourraient être moins cuits lors de la préparation culinaire, afin d'éviter une contamination par les débris des champignons à hémolysines.

### Syndrome associé

**Hémolytique** : nausées, vomissement, hématurie, jusqu'à une insuffisance rénale et anémie si consommation importante.

### Conduite à tenir

Traitement symptomatique, éventuellement hospitalisation.

# Amanita pachyvolvata

## Amanite à volve épaisse

Ordre : Agaricales      Genre : Amanita  
Sporée : Blanche

Confusions avec risques

