

Boletus erythropus / Neoboletus erythropus



Bolet à pied rouge

Ordre : Bolétales

Genre : Boletus / Neoboletus

Sporée : Brun olive

Chapeau

De 5 à 20 cm de diamètre. Epais et charnu. Consistance ferme, surface veloutée. Foncé, fauve à brun.

Zoom

Chair

Ferme, jaune à la coupe, devient instantanément bleu de Prusse à la coupure. Odeur faible.

Zoom

Hyménophore

Tubes jaunes, bleuisant au toucher. Pores fins, réguliers, rouges à orangé. Jaune vers la marge.

Zoom

Pied

Massif, en massue, très ferme. Surface non réticulée caractéristique : finement ponctué de rouge sur fond jaune.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Zoom

Boletus erythropus / Neoboletus erythropus

Bolet à pied rouge

Ordre : Bolétales

Genre : Boletus / Neoboletus

Sporée : Brun olive



Habitat

Bois clairs de feuillus, chênes notamment.

Comestibilité

Bon comestible sous condition.



Période de cueillette

Du mois de Mai jusqu'à Novembre.

Remarque

Se consomme bien cuit car il est émétique cru. Peu consommé du fait de sa coloration bleue intense à la coupe.

Des genres à lames existent en parallèle de ceux à tubes dans l'ordre des Bolétales : *Gomphidius* ; *Paxillus* ; *Omphalotus* et *Hygrophoropsis*.

Syndrome associé

Hémolytique : nausées, vomissement, hématurie, jusqu'à une insuffisance rénale et anémie si consommation importante.

Conduite à tenir


Traitement symptomatique, éventuellement hospitalisation.

Boletus erythropus / Neoboletus erythropus

Bolet à pied rouge

Ordre : Bolétales Genre : Boletus / Neoboletus
Sporée : Brun olive

Confusions avec risques



Confusions sans risques

