

# Galerina marginata



## Galère marginée

Ordre : Agaricales      Genre : Galerina  
Sporée : Brun rouille foncé

### Chapeau

De 3 à 5 cm de diamètre. D'abord campanulé puis plus ou moins mamelonné. Hygrophane. Brun fauve à jaune miel par temps sec. Marge légèrement striée.

Zoom

### Chair

Mince et fragile. Plutôt brune. Odeur farineuse. Ne pas goûter.

### Hyménophore

Jaunes à brun pâle. Lames adnées et étroites.

Zoom

### Pied

Assez long et grêle (5 à 8 cm). Pâle au dessus de la zone annulaire et brun chiné au dessous.

Zoom

### Anneau

Cortinarien, un peu membraneux, coloré par les spores. Fugace et vite apprimé.

Zoom

### Sans volve

Zoom

# Galerina marginata

## Galère marginée

Ordre : Agaricales      Genre : Galerina  
Sporée : Brun rouille foncé



### Habitat

Isolé, à grégaire, rarement en petites touffes, surtout sur souches.

### Comestibilité

Mortel.



### Période de cueillette

Du mois de Juillet jusqu'à Novembre.  
Été et automne.

### Remarque

Attention à la grande confusion avec *Kuehneromyces mutabilis* / *Pholiote changeante*. Confusion responsable de plusieurs décès.

### Syndrome associé

**Phalloïdien** : Six à vingt quatre heures après l'ingestion apparaissent vertiges et gênes respiratoires. Puis gastro-entérites aiguë, rémission apparente et atteinte hépatique avec cytolyse.

### Conduite à tenir

Réhydratation, lavage gastrique, respect des diarrhées, diurèse aqueuse forcée, pénicilline G, N acétyl cystéine (précurseur du glutathion) et épuration extra rénale si hépatite grave. Suivi des enzymes hépatiques. Dosage des amanitines et des phallotoxines possible par techniques radio-immunologique.

# Galerina marginata

## Galère marginée

Ordre : Agaricales      Genre : Galerina  
Sporée : Brun rouille foncé

### Confusions avec risques



### Confusions sans risques

