



Hydnoportia corrugata

Ordre : Hymenochaetales Genre : Hydnoportia

Macroscopie

Consistance dure, cassante, brun crème. Basidiome résupiné puis réfléchi (semi-plié), adné, rouge à brun foncé. Formation de chapeaux imbriqués ou en série latérale. Surface stérile brunâtre plus ou moins zonée, marge orange à jaune. Hyménophore lisse à granuleux, irrégulièrement craquelé, noir avec KOH.

Zoom

Microscopie de l'hyménophore

Système hyphal monomitique. Hyphes non bouclées, à paroi mince ou épaisse. Soies fusiformes à paroi épaisse, avec un sommet parfois émoussé et présentant des grains épars amorphes (non cristallisés) et hyalins.

Zoom

Spores

Spores cylindriques, légèrement allantoïdes, lisses à paroi mince. Taille des spores : 4,5-6 x 1,8-2,3 μm .

Zoom

Habitat

Sur branches pendantes ou tombées, sur troncs, sur bois mort de *Corylus*, mais également de *Quercus*, *Fagus*, *Populus*, *Prunus*, *Ulmus*, *Betula*, *Crataegus*, *Calluna*, *Rubus*. Pourriture blanche massive sur *Corylus*. Retrouvé toute l'année de manière peu fréquente, de préférence aux endroits abrités.

Comestibilité

Ce champignon a une consistance ligneuse très coriace à l'état sec, ce qui n'incite pas à essayer de le consommer. Il est sans intérêt comestible.

