

# Kuehneromyces mutabilis

## Pholiote changeante (agaric à soupe)

Ordre : Agaricales      Genre : Kuehneromyces  
Sporée : Brune



### Chapeau

De 3 à 8 cm de diamètre. Convexe puis étalé, charnu au centre avec présence d'un mamelon. Hygrophane. Brun à miel jaunâtre à partir du centre.

Zoom

### Chair

Molle dans le chapeau et fibreuse dans le pied. Blanche à jaunâtre. Odeur douce, saveur fongique.

Zoom

### Hyménophore

Lames adnées à légèrement décurrentes. Jaune pâle à brun rouille.

Zoom

### Pied

Partie supérieure jaune striée, et partie inférieure recouverte d'une armille hérissée de mèches écailleuses brunes. Allongé et sinueux. Grêle et tenace.

Zoom

### Anneau

Membraneux persistant, mais fragile.

Zoom

### Sans volve

Zoom

# Kuehneromyces mutabilis

## Pholiote changeante (agaric à soupe)

Ordre : Agaricales      Genre : Kuehneromyces  
Sporée : Brune



### Habitat

Cespiteux sur les souches de feuillus et plus rarement de conifères (épicéas).

### Comestibilité

Bon comestible.



### Période de cueillette

Du mois d'Avril jusqu'à Novembre.  
Du printemps jusqu'aux 1ères gelées.

### Remarque

Champignon qui agrémentera les potages et sauces avec son parfum fruité. Utiliser les chapeaux des exemplaires jeunes seulement.

# Kuehneromyces mutabilis

## Pholiote changeante (agaric à soupe)

Ordre : Agaricales      Genre : Kuehneromyces  
Sporée : Brune

### Confusions avec risques



### Confusions sans risques

