

Leccinum aurantiacum / quercinum



Bolet orangé

Ordre : Bolétales Genre : Leccinum
Sporée : Brun-olivâtre

Chapeau

Orangé-rougeâtre plus ou moins foncé, de 8 à 20cm de diamètre. Charnu, convexe, à cuticule feutrée. Marge lisse excédante légèrement ondulée.

Zoom

Chair

Blanche, molle dans le chapeau à maturité et ferme dans le stipe devenant gris-violacée puis noire à la coupe. Odeur faible et saveur douce.

Réactions chimiques : avec du Fer : coloration vert-bleuté sale. Avec du Formol : coloration rouge vineux.

Zoom

Hyménophore

Tubes très courts, blancs puis gris-brunâtres, échancrés longs et ventrus. Pores concolores, brunissant au toucher.

Zoom

Pied

D'abord obèse puis cylindrique et élancé. Blanc, parfois vert-bleuté à la base. Couvert de squamules blanches puis brunissantes et noircissantes.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Zoom

Leccinum aurantiacum / quercinum

Bolet orangé

Ordre : Bolétales Genre : Leccinum
Sporée : Brun-olivâtre



Habitat

Principalement sous Peuplier Tremble, dans
des bois de feuillus humides.

Comestibilité

Médiocre.



Période de cueillette

Du mois de Juillet jusqu'à Novembre.

Remarque

Se consomme très jeune, quand les tubes sont encore courts et la chair
ferme. Plus vieux, le pied fibreux devient indigeste et la chair est trop molle.
Sa chair s'oxydant à l'air, il noircit à la cuisson.
La nouvelle classification le considère comme synonyme de *L. quercinum*
(Eyssartier et al., 2011). Dans l'ordre des Boletales, il existe des genres à
lames : *Gomphidius*, *Paxillus*, *Omphalotus*, *Hygrophoropsis*.

Confusions sans risques

