

Leccinum pulchrum



Bolet panaché

Ordre : Bolétales Genre : Leccinum
Sporée : Brun-olivâtre

Chapeau

Jaune ochracé marbré de brun d'abord clair puis plus foncé, de 6 à 12cm de diamètre. Charnu, convexe, à cuticule d'abord grasse puis veloutée. Marge lisse légèrement enroulée. Souvent craquelé, devenant visqueux en vieillissant.

Zoom

Chair

Ferme, blanche et très vite rosé-rougissante à l'air et pouvant virer au vert-sale à la coupe. Jaunâtre à la base du pied. Saveur douce.

Réactions chimiques : Fer : Vert sale à gris bleuté. Formol : rapidement saumon rougeâtre.

Zoom

Hyménophore

Tubes blanc-crème à grisâtres, ventrus. Pores concolores roussissant au toucher.

Zoom

Pied

Cylindracé, clavé, blanc-crème à grisâtre, roussissant au toucher. Couvert de squamules d'abord blanches puis rapidement brunâtres à noirâtres.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Zoom

Leccinum pulchrum

Bolet panaché

Ordre : Bolétales

Genre : Leccinum

Sporée : Brun-olivâtre

Habitat

Sous feuillus, principalement Bouleaux et Saules. Très hygrophile. Mycorhizes avec les Betulas. Tendance montagnarde, très fréquent dans les régions arctiques.

Comestibilité

Médiocre.

Période de cueillette

Du mois de Juillet jusqu'à Octobre.

Remarque

Se consomme très jeune, quand les tubes sont encore courts et la chair ferme. Plus vieux, le pied fibreux devient indigeste et la chair est trop molle. Sa chair s'oxydant à l'air, il noircit à la cuisson.

Dans l'ordre des Boletales, il existe des genres à lames : Gomphidius, Paxillus, Omphalotus, Hygrophoropsis.

Confusions sans risques

