

# Leccinum roseafractum



## Bolet rude à chair rosissante

Ordre : Bolétales      Genre : Leccinum  
Sporée : Brun-olivâtre

### Chapeau

Brun-tabac à noirâtre, de 5 à 15cm de diamètre. Charnu, convexe, plutôt sec et méchuleux.

Zoom

### Chair

Molle, blanche, rosi-rougissante et virant au violacé à la coupe. Pas d'odeur ni de saveur particulière.

Réactions chimiques : Fer : gris-olivacée | Formol : saumoné.

Zoom

### Hyménophore

Tubes crème puis ochracés à brunâtres. Pores fins concolores.

Zoom

### Pied

Ventre puis élancé, robuste blanchâtre roussissant à la coupe. Couvert de méchules floconneuses grisâtres.

Zoom

### Sans anneau

Zoom

### Sans volve

Zoom

# Leccinum roseafractum

## Bolet rude à chair rosissante

Ordre : Bolétales

Genre : Leccinum

Sporée : Brun-olivâtre

### Habitat

Sous Bouleaux principalement.

### Comestibilité

Médiocre.

### Période de cueillette

Du mois de Septembre jusqu'à Novembre.

### Remarque

Se consomme très jeune, quand les tubes sont encore courts et la chair ferme. Plus vieux, le pied fibreux devient indigeste et la chair est trop molle. Sa chair s'oxydant à l'air, il noircit à la cuisson.

Dans l'ordre des Boletales, il existe es genres à lames : Gomphidius, Paxillus, Omphalotus, Hygrophoropsis.

## Confusions sans risques

Leccinum rigidipes

Bolet à pied rigide

Leccinum scabrum

Bolet rude