

# Leccinum scabrum



## Bolet rude

Ordre : Bolétales      Genre : Leccinum  
Sporée : Brun-olivacée

### Chapeau

Velouté brunâtre parfois marbré de fauve-ochracé. De 5 à 20cm de diamètre, convexe. Devient légèrement visqueux lorsqu'il est humide et craquelé lorsqu'il est sec.

Zoom

### Chair

Molle et blanche immuable ou très légèrement rosissante à la coupe. **Réactions chimiques** : Fer : gris à gris-bleuté | Formol : rose.

Zoom

### Hyménophore

Tubes blanchâtres puis gris-brunâtres. Pores ronds et fins concolores aux extrémités plus ou moins jaunâtres.

Zoom

### Pied

Elancé, blanc-grisâtre. Couvert de squamules grises noircissant en vieillissant.

Zoom

### Sans anneau

Zoom

### Sans volve

Zoom

# Leccinum scabrum

## Bolet rude

Ordre : Bolétales

Genre : Leccinum

Sporée : Brun-olivacée

### Habitat

Bois clairs, landes et pinèdes humides,  
principalement sous Bouleaux.

### Comestibilité

Médiocre.

### Période de cueillette

Du mois de Juin jusqu'à Novembre.

De Juillet jusqu'en Octobre les années chaudes.

### Remarque

Bon comestible jeune dégorgé dans du vinaigre, après avoir retiré le pied et conservé uniquement le chapeau mais très rapidement mou et sans intérêt.

Ne se conserve pas très longtemps. La variété melaneum à un chapeau brun noir et la variété cinnamomeum a un chapeau brun-rougeatre.

Dans l'ordre des Boletales, il existe des genres à lames : Gomphidius, Paxillus, Omphalotus, Hygrophoropsis.

# Leccinum scabrum

## Bolet rude

Ordre : Bolétales      Genre : Leccinum

Sporée : Brun-olivacée

### Confusions sans risques

