

# Lepiota oreadiformis

## Lépiote ressemblant au marasme des Oréades

Ordre : Agaricales      Genre : Lepiota  
Sporée : Blanche



### Chapeau

De 2 à 5 cm de diamètre. Mince, campanulé puis plan mamelonné, finement fibrilleux à squamuleux. Beige ocracé plus ou moins rosâtre avec parfois le mamelon roussâtre puis plus pâle à blanchâtre vers la marge. Marge fine, floconneuse, souvent appendiculée de restes blancs du voile.

Zoom

### Chair

Chair roussâtre dans le chapeau, blanche à ocre clair ailleurs. Odeur faible ou plus ou moins aromatique parfois de poisson. Saveur douce.

### Hyménophore

Lames, peu serrées, libres, blanchâtres.

Zoom

### Pied

Blanchâtre à ocre pâle, floconneux de blanchâtre, comme une armille.

Zoom

### Anneau

Anneau fugace. Issu d'un voile partiel très fin faisant penser à une cortine.

Zoom

### Sans volve

Zoom

# Lepiota oreadiformis

## Lépiote ressemblant au marasme des Oréades

Ordre : Agaricales      Genre : Lepiota  
Sporée : Blanche



### Habitat

Herbe, pelouses et clairières gramineuse.

### Comestibilité

Toxique.



### Période de cueillette

Du mois d'Août jusqu'à Novembre.

### Remarque

Il y aurait des variétés (ou des espèces très proches) telles que *var laevigata* qui serait plus appendiculée, à anneau subnul et presque inodore. *var pratensis* (syn *L. rocabrunae*) serait plus charnue et à odeur agréable.

### Syndrome associé

**Phalloïdien** : six à vingt quatre heures après l'ingestion apparaissent vertiges et gênes respiratoires. Puis gastro-entérites aiguë, rémission apparente et atteinte hépatique avec cytolyse.

### Conduite à tenir

Réhydratation, lavage gastrique, respect des diarrhées, diurèse aqueuse forcée, pénicilline G, N acétyl cystéine (précurseur du glutathion) et épuration extra rénal si hépatite grave.

# Lepiota oreadiformis

## Lépiote ressemblant au marasme des Oréades

Ordre : Agaricales      Genre : Lepiota  
Sporée : Blanche

### Confusions sans risques

