

# Lepista inversa (Lepista flaccida) / Paralepista inversa



**Clitocybe inversé, Clitocybe flasque, Clitocybe retourné, Clitocybe en entonnoir**

**Ordre :** Agaricales      **Genre :** Lepista / Paralepista  
**Sporée :** Blanche ou très pâle



# Lepista inversa (Lepista flaccida) / Paralepista inversa

## Clitocybe inversé, Clitocybe flasque, Clitocybe retourné, Clitocybe en entonnoir

Ordre : Agaricales      Genre : Lepista / Paralepista  
Sporée : Blanche ou très pâle

### Habitat

En rond de sorcières, sous conifères parfois feuillus.



### Comestibilité

Comestible mais de qualité gustative moyenne et pouvant provoquer certains troubles gastriques chez des personnes fragilisées.



### Période de cueillette

Du mois de Septembre jusqu'à Décembre.  
Dès le printemps mais surtout à l'automne.

### Remarque

Le Clitocybe inversé est considéré comme comestible, il est, parfois consommé en France mais il n'est pas traditionnellement consommé par les anglo-saxons. Attention à sa ressemblance le Clitocybe à bonne odeur, très toxique qui se distingue par son odeur fortement aromatique très caractéristique évoquant la fleur d'oranger, la poire, le jasmin.

# Lepista inversa (Lepista flaccida) / Paralepista inversa

## Clitocybe inversé, Clitocybe flasque, Clitocybe retourné, Clitocybe en entonnoir

Ordre : Agaricales      Genre : Lepista / Paralepista  
Sporée : Blanche ou très pâle

### Confusions avec risques



### Confusions sans risques

