

Strobilomyces strobilaceus

Bolet pomme de pin

Ordre : Bolétales Genre : Strobilomyces
Sporée : Brun-pourpre



Chapeau

De 3 à 16 cm de diamètre, gris clair, couvert de grosses écailles fibrillo-laineuses gris noirâtres provenant du voile partiel. Marge épaisse, appendiculée et excédante.

Zoom

Chair

Ferme et fibreuse, blanc-crème, rougissant rapidement puis noircissant à la coupe. Odeur fruitée, saveur douce.

Zoom

Hyménophore

Tubes longs et séparables, gris violacés puis brun-noirâtres. Pores larges concolores, rougissant au toucher.

Zoom

Pied

Cylindrique, long et fibrilleux, couvert de grosses méchules laineuses violet foncé à noires sur fond pale.

Zoom

Anneau

Anneau fugace laineux violet foncé, très rapidement confondu avec les méchules du pied.

Zoom

Sans volve

Zoom

Strobilomyces strobilaceus

Bolet pomme de pin

Ordre : Bolétales

Genre : Strobilomyces

Sporée : Brun-pourpre



Habitat

Principalement sous Hêtres, mais trouvé dans les forêts mixtes. Héliophile.

Comestibilité

Comestible médiocre, à protéger donc éviter de cueillir.



Période de cueillette

Du mois de Juin jusqu'à Août.

Remarque

Seule espèce du genre Strobilomyces rencontrée en Europe.
Rare et inscrit sur la liste rouge dans de nombreux pays.
Dans l'ordre des Boletales, il existe des genres à lames :
Gomphidius, Paxillus, Omphalotus, Hygrophoropsis.
Aucune confusion.