



Suillus tridentinus

Bolet du trentin

Ordre : Bolétales Genre : Suillus
Sporée : Brun-olivacée

Chapeau

Orangé à brun rouille sur fond jaune-orangé, de 5 à 12 cm de diamètre. Convexe, charnu, fibrilleux-squamuleux à cuticule visqueuse séchant en vieillissant.

Zoom

Chair

Ferme, jaune-orangée voire rouillée à la coupe. Odeur faible, saveur douce.

Zoom

Hyménophore

Tubes jaunes puis orangés, décourants, laissant une impression de réseau sur le haut du stipe. Pores orange immuable, amples et anguleux.

Zoom

Pied

Cylindrique concolore, légèrement réticulé de brun rouille au-dessus de l'anneau et fibrilleux en bas.

Zoom

Anneau

Anneau laineux concolore, très fragile.

Zoom

Sans volve

Zoom

Suillus tridentinus

Bolet du trentin

Ordre : Bolétales Genre : Suillus

Sporée : Brun-olivacée



Habitat

Sous Mélèzes uniquement, en région montagnaise.

Comestibilité

Médiocre à condition de retirer sa cuticule laxative.



Période de cueillette

Du mois de Juillet jusqu'à Octobre.

Remarque

Comestible à condition de retirer la cuticule laxative. Sans grand intérêt mais tout de même plus recherché que Suillus bovinus. Dans l'ordre des Boletales, il existe des genres à lames : Gomphidius, Paxillus, Omphalotus, Hygrophoropsis. Aucune notamment à cause de son habitat et de sa couleur assez unique chez les bolétales.