

Suillus viscidus



Bolet du mélèze, Bolet visqueux

Ordre : Bolétales Genre : Suillus
Sporée : Brune

Chapeau

Beige ivoire puis gris-brun à reflets verdâtres, de 4 à 10 cm de diamètre, Hémisphérique puis convexe charnu. Marge appendiculée et cuticule visqueuse.

Zoom

Chair

Blanchâtre puis bleu-verdâtre marbré de violet. Molle et spongieuse, à odeur faible et saveur douce.

Hyménophore

Tubes blanchâtre puis gri-olivacé brunissant au toucher et légèrement décourants. Pores amples concolores, irréguliers.

Zoom

Pied

Ferme, cylindrique plus ou moins clavé. Subconcolore au-dessus de l'anneau et rougeâtre au-dessous. Visqueux.

Zoom

Anneau

Anneau membraneux blanchâtre fugace qui s'apprime en une zone brune.

Zoom

Sans volve

Zoom

Suillus viscidus

Bolet du mélèze, Bolet visqueux

Ordre : Bolétales

Genre : Suillus

Sporée : Brune

Habitat

Sous Mélèzes, de préférence en région montagnarde. Sur sols calcaires.



Comestibilité

Comestible sans intérêt et à condition de retirer la cuticule laxative.



Période de cueillette

Du mois de Juillet jusqu'à Novembre.

Remarque

Comestible à condition de retirer la cuticule laxative, mais peu recherché à cause de son goût et de sa chair élastique.
Dans l'ordre des Boletales, il existe des genres à lames : Gomphidius, Paxillus, Omphalotus, Hygrophoropsis.

Confusions sans risques

Suillus flavidus

Bolet jaunâtre

Suillus grevillei

Bolet élégant