

# Xerocomus armeniacus / Rheubarbariboletus armeniacus



## Bolet abricot

**Ordre :** Bolétales

**Genre :** Xerocomus / Rheubarbariboletus

**Sporée :** Brun-olivacée

### Chapeau

D'abord rose lilacin puis brun-orange, de 3 à 10 cm de diamètre. Hémisphérique puis aplati avec l'âge. Cuticule veloutée, craquelée par temps sec. Il ressemble à un abricot desséché.

Zoom

### Chair

Chair ferme, jaune dans le chapeau et abricot dans le bas du pied, bleuissant à la coupe.

Zoom

### Hyménophore

Tubes jaunes-vert bleuissant au toucher. Pores amples concolores.

Zoom

### Pied

Fin et cylindrique à fusiforme. Jaune en haut et orange en bas, parsemé de flocons rouges.

Zoom

### Sans anneau

Zoom

### Sans volve

Zoom



# Xerocomus armeniacus / Rheubarbariboletus armeniacus

## Bolet abricot

Ordre : Bolétales

Genre : Xerocomus / Rheubarbariboletus

Sporée : Brun-olivacée



### Habitat

Champignon rare, héliophile et thermophile.



### Comestibilité

Médiocre.

### Période de cueillette

Du mois de Juin jusqu'à Septembre.

### Remarque

Dans l'ordre des Boletales, il existe des genres à lames :  
Gomphidius, Paxillus, Omphalotus, Hygrophoropsis.

## Confusions sans risques

\*fiche non disponible  
Rheubarbariboletus persicolor

Boletus persicolor

Bolet couleur de pêche

\*photo non disponible