

Xerocomus badiorufus



Bolet à tubes courts, Bolet brun fauve

Ordre : Bolétales Genre : Xerocomus
Sporée : Brun-olivacée

Chapeau

Brun fauve à brun marron, velouté, de 6 à 15cm de diamètre.
Marge enroulée, à fin liseré blanc. Se craquelant quand il sèche.

Zoom

Chair

Blanc-grisâtre, ferme, épaisse, très légèrement rosissante puis
bleuissante à la coupe. Odeur faible, saveur douce.

Zoom

Hyménophore

Tubes blanc-grisâtres à jaune pâle, très courts, légèrement
décurrents. Pores fins, concolores, non bleuissant au toucher
mais légèrement bleuissant à la coupe.

Zoom

Pied

Beige à brun clair, couvert de ponctuations brunes à la base.
Cylindrique et radicant.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Zoom

Xerocomus badiorufus

Bolet à tubes courts, Bolet brun fauve

Ordre : Bolétales Genre : Xerocomus
Sporée : Brun-olivacée



Habitat

Sous châtaigner, pins et bouleaux principalement. Acidophile et aimant les terrains sablonneux.

Comestibilité

Médiocre.



Période de cueillette

Du mois de Juin jusqu'à Septembre.

Remarque

Champignon rare. Souvent encore considéré comme une sous espèce de Xerocomus badius.

Des genres à lames existent en parallèle de ceux à tubes dans l'ordre des Bolétales : Gomphidius ; Paxillus ; Omphalotus ; Hygrophoropsis.

Xerocomus badiorufus

Bolet à tubes courts,

Bolet brun fauve

Ordre : Bolétales Genre : Xerocomus

Sporée : Brun-olivacée

Confusions sans risques

