

# Xerocomus porosporus / Xerocomellus porosporus



## Bolet à spores porées, Bolet fissuré

Ordre : Bolétales

Genre : Xerocomus / Xerocomellus

Sporée : Brun-olivacée

### Chapeau

Brun olivâtre à noirâtre avec l'âge. De 4 à 10 cm de diamètre, hémisphérique puis convexe. Cuticule feutrée, sèche, vite très craquelée laissant apparaître une couleur jaunâtre.

Zoom

### Chair

Molle, blanc-sâle, jaune sous la cuticule, bleissant légèrement à l'air. Rouge à la base du pied. Saveur douce, odeur faible.

### Hyménophore

Tubes jaunes et pores anguleux concolores, bleissant au toucher. Spores tronquées à une extrémité.

Zoom

### Pied

Cylindrique. Jaune puis brunâtre, noir à la base.

Zoom

### Sans anneau

Zoom

### Sans volve

Zoom

# Xerocomus porosporus / Xerocomellus porosporus

## Bolet à spores porées, Bolet fissuré

Ordre : Bolétales

Genre : Xerocomus / Xerocomellus

Sporée : Brun-olivacée

### Habitat

Sous chênes et hêtres principalement, parfois  
bouleaux. Plutôt grégaire mais très rare.

### Comestibilité

Médiocre.

### Période de cueillette

Du mois de Juin jusqu'à Novembre.

### Remarque

Comestible très médiocre du fait de sa chair mollissant  
rapidement à la cuisson. Plutôt rare.

Dans l'ordre des Boletales, il existe des genres à lames :  
Gomphidius, Paxillus, Omphalotus, Hygrophoropsis.

## Confusions sans risques

