

Xerocomus subtomentosus



Bolet subtomenteux, Bolet à spores porées

Ordre : Bolétales Genre : Xerocomus
Sporée : Brune-olivacée

Chapeau

De 4 à 12 cm de diamètre, hémisphérique puis convexe, s'aplatissant rapidement. Cuticule feutrée et sèche de couleur ocre à brun-olivacée.

Zoom

Chair

Ferme, blanc-jaunâtre et rosée dans le pied et sous la cuticule, bleuisant très légèrement à la coupe. Odeur fruitée, saveur douce.

Hyménophore

Tubes jaunes vif puis olivacés en filet. Pores concolores irréguliers, très peu bleuissant au toucher.

Zoom

Pied

Cylindrique et tordu, atténué à la base. Jaune pâle à brunâtre, strié longitudinalement de brun.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Sans.

Zoom

Xerocomus subtomentosus

Bolet subtomenteux, Bolet à spores poréest

Ordre : Bolétales Genre : Xerocomus
Sporée : Brune-olivacée



Habitat

Sous feuillus et conifères, de préférence en lisière.



Comestibilité

Médiocre.



Période de cueillette

Du mois de Juillet jusqu'à Octobre.

Remarque

Comestible très médiocre du fait de sa chair mollissant rapidement à la cuisson.

Dans l'ordre des Bolétales, il existe des genres à lames : Gomphidius, Paxillus, Omphalotus, Hygrophoropsis.

Confusions sans risques

