



Amanita pantherina

Amanite panthère

Ordre : Agaricales Genre : Amanita
Sporée : Blanche

Chapeau

De 5 à 10 cm de diamètre. Gris à brun, orné de restes de voile général blancs pur, isolés et disposés en cercles concentriques plus ou moins nets. Marge courtement striée.

Zoom

Chair

Blanche et fragile. Odeur faible de radis.

Hyménophore

Lames blanches, libres, serrées.

Zoom

Pied

Blanc et bulbeux à la base.

Zoom

Anneau

Blanc, membraneux, non strié, fugace et descendant (supère).

Zoom

Volve

Formant un bourrelet floconneux, grisâtre, presque circonscise. Surmontée d'un ou deux bracelets obliques caractéristiques.

Zoom

Amanita pantherina

Amanite panthère

Ordre : Agaricales Genre : Amanita
Sporée : Blanche



Habitat

Sous feuillus et conifères. Sur sol argilo-calcaire ou sablonneux.

Comestibilité

Toxique.



Période de cueillette

Du mois de Juillet jusqu'à Novembre.
Fin d'été à automne.

Remarque

Espace redoutable d'autant qu'elle est variable. (Variété abietum, avec verrues grisâtres et marge non striée chez l'individu jeune).

Le dessus de l'anneau devient jaune-orangé à la soude contrairement à Amanita spissa et ses apparentés.

Dans tous les cas où la totalité du pied n'a pas été ramassé, il est difficile, voire impossible de conclure, car le voile partiel et général est caractéristique mais fragile. La toxicité de ce champignon est suffisante pour éliminer du panier tous les champignons en contact avec ceux-ci.

Syndrome associé

Myco-atropinien : trois heures après ingestion apparaissent diarrhées profuses, vomissements, hypersalivation. Egalement, signes nerveux avec délire furieux et hallucinations.

Conduite à tenir


Compensation des pertes hydriques, soutenir le cœur et calmer les troubles psychiques.

Amanita pantherina

Amanite panthère

Ordre : Agaricales Genre : Amanita
Sporée : Blanche

Confusions avec risques



Confusions sans risques

