Amanita virosa



Amanite vireuse

Ordre: Agaricales Genre: Amanita

Sporée : Blanche

















Amanita virosa

Amanite vireuse

Ordre: Agaricales Genre: Amanita

Sporée : Blanche



Habitat

Sous conifères, sur terrain acide et humide en montagne.

Comestibilité

Mortel.



Période de cueillette

Du mois de Juin jusqu'à Novembre. Eté et automne.

Remarque

Réaction orange à la potasse. Il faut avoir une vigilance constante lors du ramassage de champignon blancs dans les bois.

Dans tous les cas où la totalité du pied n'a pas été ramassé, il est difficile, voire impossible de conclure, car le voile partiel et général est caractéristique mais fragile.

La toxicité des champignons à amanitine est suffisante pour éliminer du panier tous les champignons en contact avec ceux-ci.

Syndrome associé

Phalloïdien : six à vingt quatre heures après l'ingestion apparaissent vertiges et gênes respiratoires. Puis gastro-entérite aiguë, rémission apparente et atteinte hépatique avec cytolyse.

Conduite à tenir

Réhydratation, lavage gastrique, respect des diarrhées, diurèse aqueuse forcée, pénicilline G, N acétyl cystéine (précurseur du glutathion) et épuration extra rénale si hépatite grave. Suivi des enzymes hépatiques. Dosage des amanitines et des phallotoxines possible par techniques radio-immunologiques.





Amanita virosa

Amanite vireuse

Ordre: Agaricales Genre: Amanita

Sporée : Blanche

Confusions avec risques









Confusions sans risques













