

Bankera violascens



Hydne violacé

Ordre : Thelephorales

Genre : Bankera

Sporée : Blanche

Chapeau

De 3 à 13 cm de diamètre. De forme légèrement convexe puis aplatie. Brun-grisâtre pâle à brun violacé au centre et blanchâtre à fauve pâle vers la marge, devenant plus foncé avec l'âge.

Zoom

Chair

Chair fibreuse, parfois cassante, plus coriace à la base. Blanchâtre à brun pâle devenant lentement gris violacé à la coupe. Saveur douce. Odeur de fénugrec ou de chicorée devenant plus forte en séchant.

Hyménophore

Aiguillons de 5 à 6 mm, décourants. Blanchâtre à chamois grisâtre.

Zoom

Pied

De taille moyenne, finement feutré et lisse, brun-grisâtre à la base et blanchâtre vers l'apex.

Zoom

Sans Anneau

Zoom

Sans Volve

Zoom

Bankera violascens

Hydne violacé

Ordre : Thelephorales Genre : Bankera
Sporée : Blanche

Habitat

Sous conifères. Il est assez rare et appartient à des listes rouges de champignons protégés dans de nombreux pays.



Comestibilité

Non comestible.



Période de cueillette

Du mois d'août jusqu'à octobre.

Remarque

Aucune.

Bankera violascens

Hydne violacé

Ordre : Thelephorales Genre : Bankera
Sporée : Blanche

Confusions sans risques

