



# Boletus pinophilus

## Bolet acajou, cèpe des pins

Ordre : Bolétales      Genre : Boletus  
Sporée : Brun olivâtre

### Chapeau

Brun acajou, parfois brun clair à cuticule mâte, veloutée couverte de pruine blanche chez le jeune spécimen. De 6 à 20 cm de diamètre, hémisphérique puis convexe, charnu et souvent cabossé à marge lisse.

Zoom

### Chair

Chair blanche immuable, souvent vineuse sous la cuticule du chapeau. Ferme et de saveur douce.

Zoom

### Hyménophore

Tubes blancs puis jaune verdâtres, parfois tachetés de brun.  
 Pores arrondis, fins, concolores et immuables.

### Pied

Brun rougeâtre à la base et plus clair au sommet parsemé d'un réseau blanc sur les deux tiers supérieurs. Ferme, cylindrique obèse à ventru.

Zoom

### Sans anneau

Zoom

### Sans volve

Zoom

# Boletus pinophilus

## Bolet acajou, cèpe des pins

Ordre : Bolétales

Genre : Boletus

Sporée : Brun olivâtre



### Habitat

Bois de feuillus et/ou conifères, surtout sous Pins sylvestres, Sapins, Epicéas et Hêtres.  
Sols sableux et acides.

### Comestibilité

Excellent comestible.



### Période de cueillette

Du mois de Juillet jusqu'à Novembre.

### Remarque

Très commun dans le sud, un peu plus rare dans le nord.  
Des genres à lames existent en parallèle de ceux à tubes dans l'ordre des Bolétales : *Gomphidius* ; *Paxillus* ; *Omphalotus* ; *Hygrophoropsis*.

## Confusions sans risques

