

Boletus subappendiculatus / Butyriboletus subappendiculatus



Bolet subappendiculé, cèpe des sapins

Ordre : Bolétales

Genre : Boletus / Butyriboletus Sporée : Brun olive

Chapeau

Brun fauve à ochracé rougeâtre, de 7 à 20 cm de diamètre.
Convexe, charnu à cuticule veloutée, feutrée et parfois craquelée.
Réaction de la cuticule à KOH : Rouge vif (! B. appendiculatus :
brun rouge)

Chair

Chair citrine, immuable. Odeur faible et saveur douce.
Ferme et non bleuisse à la pression (! B. appendiculatus)

Zoom

Hyménophore

Tubes jaune pâle. Pores concolores parfois lavés de rougeâtre.

Zoom

Pied

Jaune pâle à fin réseau concolore voire jaune orangé, teinte
brunâtre à la base. Obèse et légèrement radicant.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Zoom

Boletus subappendiculatus / Butyriboletus subappendiculatus

Bolet subappendiculé, cèpe des sapins

Ordre : Bolétales

Genre : Boletus / Butyriboletus Sporée : Brun olive

Habitat

Forêts de conifères de l'étage montagnard et subalpin. Acidophile.



Comestibilité

Comestible.



Période de cueillette

Du mois de Juillet jusqu'à Octobre.

Dès le printemps mais surtout à l'automne.

Remarque

Comestible mais très rare donc à protéger et éviter de ramasser.
Des genres à lames existent en parallèle de ceux à tubes dans l'ordre des Bolétales : *Gomphidius* ; *Paxillus* ; *Omphalotus* ; *Hygrophoropsis*.

Confusions sans risques

