

Clitocybe acromelalga / Paralepistopsis acromelalga

Ordre : Agaricales

Genre : Clitocybe / Paralepistopsis **Sporée :** Blanche

Chapeau

Jaune, orange à rouge brique, de 3 à 10 cm de diamètre. En entonnoir à dépression centrale. Glabre et lisse. Marge enroulée qui devient lisse à maturité. Hygrophane.

Chair

Chair mince, fibreuse dans le pied. Odeur fruitée. Saveur fongique de Shiitake.

Hyménophore

Lames serrées voir très serrées, décurrentes, et inégales. Arête concolore.

Pied

Cylindrique, fibreux, revêtement lisse avec parfois des fibrilles. Base pruineuse bien enfoncée dans la litière.

Sans Anneau

Sans Volve

Clitocybe acromelalga / Paralepistopsis acromelalga

Ordre : Agaricales

Genre : Clitocybe / Paralepistopsis **Sporée :** Blanche



Habitat

Terricole ou sous les bambous. Cespiteux ou disposé en cercle.

Comestibilité

Toxique.



Période de cueillette

Aucune.

Remarque

Ne se retrouve qu'au Japon. Surnommé Poison des Sasa ou champignon aux brûlures. L'acide nicotinique est à l'étude comme traitement contre ce syndrome.

Syndrome associé

Acromélagien : atteinte des fibres non myélinisées du système nerveux périphérique par les acides acroméliques. Douleur, rougeur et œdèmes dans les membres après 24h.

Conduite à tenir

Hospitalisation. Antalgiques. Bains d'eau glacée.