

Clitocybe dealbata

Clitocybe blanchi

Ordre : Agaricales Genre : Clitocybe
Sporée : Blanche ou très pâle



Chapeau

De 2 à 4 cm de diamètre. Revêtement glacé, blanc satiné rosâtre.
Plat, légèrement creux. Marge mince et retroussée.

Zoom

Chair

Tendre à fibreuse. Blanche. Odeur forte et complexe de farine.

Hyménophore

Lames blanches à grisâtres. Peu décourbées.

Zoom

Pied

Blanc. Court. Surface fibrilleuse roussissant progressivement de la base. Mycélium agglomérant à la base du pied.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Zoom

Clitocybe dealbata

Clitocybe blanchi

Ordre : Agaricales Genre : Clitocybe
Sporée : Blanche ou très pâle

Habitat

Prés, pelouses, bord des chemins herbeux.



Comestibilité

Toxique.



Période de cueillette

Du mois de Septembre jusqu'à Novembre.
Automne, temps froid et humide.

Remarque

Se méfier des petits champignons entièrement blancs. Attention à la confusion avec le *Clitopilus prunulus* / *Clitopile petite prune* ou meunier. Plusieurs décès déjà décrits.

Syndrome associé

Sudorien : 15 minutes à 3 heures après l'ingestion.
Gastroentérites avec nausées, vomissements et diarrhées. Puis syndrome cholinergique : hypersécrétions généralisées (hypersialorrhées, sudation intense, encombrements bronchiques) ; bradycardie ; myosis ; paresthésies.

Conduite à tenir

Hospitalisation et traitement par atropine. 1 mg toutes les 10 minutes jusqu'à mydriase et arrêt des sécrétions (attention au surdosage).

Clitocybe dealbata

Clitocybe blanchi

Ordre : Agaricales Genre : Clitocybe
Sporée : Blanche ou très pâle

Confusions sans risques

