



Lactarius torminosus

Lactaire toisonné (Lactaire à colique)

Ordre : Russulales Genre : Lactarius
Sporée : Crème

Chapeau

De 5 à 12 cm de diamètre. Rougeâtre à rosé zoné de rouge brique. Marge longtemps enroulée, barbue et toison laineuse bien développée surtout chez les jeunes.

Zoom

Chair

Blanche à rosé, épaisse, odeur fruitée de pomme ou de pélagonium, âcre. Présence d'un lait blanc immuable jaunissant lentement.

Zoom

Hyménophore

Lames serrées, étroites, minces, fourchues et décurrentes. Près du pied. Blanche à rosé.

Zoom

Pied

Creux, blanc et généralement rose au sommet, parfois scrobiculé.

Zoom

Sans anneau

Zoom

Sans volve

Zoom

Lactarius torminosus

Lactaire toisonné (Lactaire à colique)

Ordre : Russulales Genre : Lactarius
Sporée : Crème



Habitat

Sous feuillus, bouleaux.

Comestibilité

Toxique.



Période de cueillette

Du mois de Juin jusqu'à Novembre.

Remarque

Lait orangé à la potasse. Mycorhizique des bouleaux.

Syndrome associé

Troubles digestifs, parfois intenses mais de courte durée.

Conduite à tenir

Sans.

Lactarius torminosus

Lactaire toisonné (Lactaire à colique)

Ordre : Russulales Genre : Lactarius
Sporée : Crème

Confusions avec risques



Confusions sans risques

