

# Lentinellus cochleatus

## Lentin en colimaçon

**Ordre :** Russulales    **Genre :** Lentinellus  
**Sporée :** Brune

### Chapeau

De 2 à 9 cm de diamètre. Infundibuliforme fendu d'un côté, souvent tordu sur lui-même. Brun fauve à brun ochracé, taché de rouille en séchant. Hygrophane, s'opacifiant et pâlissant à la déshydratation.

### Chair

Chair coriace, brun pâle au frais à blanche au sec. Saveur douce, anisée, parfois âcre. Odeur fortement anisée, critère important de détermination.

### Hyménophore

Lames fortement décurrentes à arête dentelée. Blanches à ochracées devenant brunâtres tachetées avec l'âge.

### Pied

De taille moyenne, souvent fusionné à d'autres, lisse à profondément sillonné. Concolore au chapeau puis noirâtre vers la base avec l'âge.

### Sans Anneau

### Sans Volve

# Lentinellus cochleatus

## Lentin en colimaçon

Ordre : Russulales    Genre : lentinellus

Sporée : Brune



### Habitat

Sous feuillus, plus rarement sous conifères, sur bois et souches en décomposition, en touffe.

### Comestibilité

Non comestible.



### Période de cueillette

Du mois d'août jusqu'au mois d'octobre.

### Remarque

Aucune.

## Confusions sans risques

