

Lepiota cristata



Lépiote créée

Ordre : Agaricales Genre : Lepiota
Sporée : Blanche

Chapeau

De 2 à 5 cm de diamètre. Calotte discale étroite brune rousse bien délimitée. Ecailles concentriques sur fond pâle.

Zoom

Chair

Blanchâtre, odeur, très typique et complexe à décrire : mélange d'acidité de métal rouillé et de caoutchouc, de scléroderme en fait une odeur de référence « odeur de cristata » saveur métallique.

Hyménophore

Lames libres blanchâtres.

Zoom

Pied

Fibrilleux, blanc vers le sommet et vineux à la base.

Zoom

Anneau

Blanc, fugace. Ascendant.

Zoom

Sans volve

Zoom

Lepiota cristata

Lépiote crétée

Ordre : Agaricales Genre : Lepiota
Sporée : Blanche



Habitat

Clairières, lisières des bois.

Comestibilité

Toxique.



Période de cueillette

Du mois de Juin jusqu'à Novembre.
Eté et automne.

Remarque

L'odeur «dite de Lepiota cristata» permet le plus souvent de conclure.
Espèce qui peut atteindre 7 cm de diamètre : elle est alors désignée sous le nom de Lepiota cristataf. major. Les petites lépiotes (moins de 10 cm) dites rougissantes doivent être rejetées, en effet, les espèces citées dans les risques de confusion de cette fiche sont, elles, responsables de syndrômes phalloïdiens liés à la présence d'amanitines.

Syndrome associé

Probable syndrome résinoidien, l'absence d'amatoxine a été démontré, cette lépiote ne donne donc pas de syndrome phalloïdien.

Conduite à tenir

Retour à la normale spontané. Eventuellement hospitalisation avec rééquilibrage hydroélectrolytique.

Lepiota cristata

Lépiote crétée

Ordre : Agaricales Genre : Lepiota
Sporée : Blanche

Confusions avec risques



Confusions sans risques

