

Macrolepiota rhacodes / Chlorophyllum rhacodes



Lépiote déguenillée

Ordre : Agaricales

Genre : Macrolepiota / Chlorophyllum

Sporée : Blanche



Chapeau

De 8 à 15 cm de diamètre. Couvert d'écaillés très retroussées grises à beiges sur fond crème, presque laineux. Très charnu. Calotte discale étroite.

Zoom



Chair

Blanche, rougissante à la blessure. Tendre dans le chapeau et fibreuse dans le pied. Odeur faible, saveur de noisette.

Zoom



Hyménophore

Lames blanches, rougissantes au froissement. Fortement libres (collariées) et ventruées.

Zoom



Pied

Blanc à roux, bruni à noircit en séchant. Lisse, creux, non chiné, légèrement strié cannelé. Se termine par un bulbe volumineux.

Zoom



Anneau

Coloré de marron foncé sur la face inférieure. Complexe, double et descendant.

Zoom



Sans volve

Zoom

Macrolepiota rhacodes / Chlorophyllum rhacodes

Lépiote déguenillée

Ordre : Agaricales

Genre : Macrolepiota / Chlorophyllum Sporée : Blanche



Habitat

Sous épicéas, surtout en lisière.

Comestibilité

Bon comestible.



Période de cueillette

Du mois de Juillet jusqu'à Octobre.

Remarque

Quelques intoxications alimentaires non constantes et probablement dues à la consommation des variétés suivantes :

Var. bohemica plus grande et à squames brun rouge, orange à la blessure (à rejeter).

Var. venenata poussant dans les abords de décharge et dépotoirs (à rejeter).

Toutes les petites lépiotes dites rougissantes sont toxiques ou mortelles (moins de 10 cm).


Macrolepiota rhacodes / Chlorophyllum rhacodes

Lépiote déguenillée

Ordre : Agaricales

Genre : Macrolepiota / Chlorophyllum Sporée : Blanche

Confusions avec risques



Confusions sans risques

