



Pleurotus ostreatus

Pleurote en huître, Pleurote en coquille, Oreille de noyer

Ordre : Tricholomatales Genre : Pleurotus
Sporée : Blanche

Chapeau

Chapeau de 2-30 cm de diamètre. Les couleurs sont assez variables, elles peuvent aller du brillant au mat, du beige au gris teinté de violet-bleu ou de brun. La marge du chapeau est lisse, obtuse (arrondie et ne présentant pas de saillies).

Zoom

Chair

Les spores sont blanches et mesurent 7,5-11 par 3-4 μm en moyenne. Sa saveur est douce et son odeur agréable.

Hyménophore

De couleurs blanchâtres puis grisâtres et sont décurrentes.

Zoom

Pied

Court pouvant même être absent et latéral. De couleur blanche, il mesure 1-5 par 1,2-5 cm.

Zoom

Sans Anneau

Zoom

Sans Volve

Zoom

Pleurotus ostreatus

Pleurote en huître, Pleurote en coquille, Oreille de noyer

Ordre : Tricholomatales Genre : Pleurotus
Sporée : Blanche



Habitat

Sous les troncs de feuillus en touffes.

Comestibilité

Bon comestible.



Période de cueillette

De l'automne à l'hiver.

Remarque

C'est un champignon facilement et largement cultivé.