



# Russula subnigricans

## Fausse russule noircissante

**Ordre :** Russulales    **Genre :** Russula  
**Sporée :** Blanche

### Chapeau

Chapeau d'environ 8-11 cm de diamètre. De couleur gris-brun, il est plus pâle au niveau de la marge. Ce dernier est d'abord convexe puis plan et déprimé au centre, en forme d'entonnoir. La cuticule du chapeau est sèche.

### Chair

La chair est épaisse, dure, inodore. Elle n'est pas immuable. Celle-ci est blanche et elle rougit à la coupe ce qui le différencie de Russula nigricans qui, elle, noircit. Les spores mesurent 7 -9 par 6 – 7  $\mu\text{m}$ , ornées de fines verrues reliées en fin réseau. La fausse russule noircissante à une saveur douce.

### Hyménophore

Les lames sont blanches, brunes, crème, adnées, subdécurrentes, espacées, rougissantes quand on les touche. De plus, elles mesurent 6 – 9 mm d'épaisseur.

### Pied

Le stipe est plein, légèrement ridulé le long du pied, blanc crème, plus pâle que le chapeau. Celui-ci mesure 3 – 6 par 1 – 2,5 cm.

### Sans Anneau

### Sans Volve

# Russula subnigricans

## Fausse russule noircissante

Ordre : Russulales    Genre : Russula

Sporée : Blanche



### Habitat

Vit sous les feuillus ; parfois en troupe dans des forêts de feuillus, surtout de chênes verts et Castanopsis.

### Comestibilité

Mortel.



### Période de cueillette

?

### Remarque

Aucune.

### Syndrome associé

Les symptômes typiques observés après l'ingestion de *R. subnigricans* sont des vomissements et diarrhées qui apparaissent 30 minutes environ après l'ingestion, suivis de raideur des épaules, de maux de dos, du sang dans les urines (couleur brun-rouge des urines due à un taux élevé de myoglobine). Dans les cas graves d'intoxication, d'autres symptômes sont présents : troubles de la parole, convulsion chronique, contraction des pupilles, perte de connaissance et affaiblissement du cœur pouvant entraîner la mort.

### Conduite à tenir

Réhydratation, urgence si cas graves.