

# Suillus bovinus

## Bolet des bouviers

Ordre : Bolétales      Genre : Suillus  
Sporée : Brun-olivacée



### Chapeau

Paille à brun ochracé avec parfois des reflets rouges, de 4 à 12 cm de diamètre. Hémisphérique puis convexe, charnu plus ou moins bosselé. Marge lisse plus pâle que le reste du chapeau. Cuticule visqueuse et brillante, séparable mais tenace.

Zoom

### Chair

Molle, élastique, couleur crème immuable (ou parfois très légèrement bleuissant sous la cuticule). Sans saveur, odeur légèrement fruitée. Rosissant à la cuisson.

Zoom

### Hyménophore

Tubes jaunes grisâtres pâles, court et ronds chez le jeune spécimen puis moutarde-olivacés très légèrement décurrents. Pores amples, anguleux, concolores et multiples à maturité. Parfois apparition de tons rosés.

Zoom

### Pied

Ferme, cylindrique, plus ou moins flexueux. Concolore ou plus pâle que le chapeau.

Zoom

### Sans anneau

Zoom

### Sans volve

Zoom

# Suillus bovinus

## Bolet des bouviers

Ordre : Bolétales      Genre : Suillus  
Sporée : Brun-olivacée



### Habitat

Cespiteux, dans les zones herbues des bois de Pins et des landes et dans les Bruyères. Sur les sols aérés et acides.

### Comestibilité

Comestible de peu d'intérêt et à condition de retirer la cuticule laxative.



### Période de cueillette

Du mois de Juin jusqu'à Octobre.  
Mi été à fin de l'automne.

### Remarque

Comestible à condition de retirer la cuticule laxative, mais sans grand intérêt (goût faible et chair élastique.) La base du pied peut parfois être colorée de rose par les mycéliums de Gomphidius roseus avec qui il est en symbiose.

Dans l'ordre des Boletales, il existe des genres à lames : Gomphidius, Paxillus, Omphalotus, Hygrophoropsis.

## Confusions sans risques

