



# Pluteus cervinus

## Plutée couleur de cerf

Ordre : Agaricales      Genre : Pluteus  
Sporée : Rose

### Chapeau

Chapeau de 2,5 à 12 cm, conique, campanule au début puis convexe à aplatit, avec un mamelon. Finement fibrilleux-soyeux au bord, un peu gras au toucher, et avec de petites mèches brunes au centre, brun-marron à gris brun avec le bord plus clair.

Zoom

### Chair

La chair est blanchâtre. Peu épaisse sauf dans le mamelon et dans le haut du stipe, fibreuse dans le pied.

Zoom

### Hyménophore

Les lames sont libres, blanches puis roses due à la couleur de la sporée. Les arêtes des lames sont finement appendiculées.

Zoom

### Pied

Pied de 4-15 par 0,5-3 cm, crème avec des fibrilles brunes vers la base. De forme cylindrique, légèrement épaissi à la base, plein et cassant. La surface est lisse à légèrement striée longitudinalement.

Zoom

# Pluteus cervinus

## Plutée couleur de cerf

Ordre : Agaricales      Genre : Pluteus  
Sporée : Rose



### Habitat

Se trouve surtout sur des bois mort de feuillus, mais se trouve aussi sur des conifères.

### Comestibilité

Comestible, sans intérêt.



### Période de cueillette

De juin à novembre.

### Remarque

Saveur douce avec une forte odeur de rave "radis" et à saveur légèrement amarescente.

Son absence de goût après la cuisson le rend peu intéressant.

Son nom usuel trouve son origine dans le fait que les cervidés s'en nourrissent volontiers.