

# Tricholoma columbetta

## Tricholome colombette

Ordre : Agaricales      Genre : Tricholoma  
Sporée : Blanche



### Chapeau

Chapeau de 4-12 cm, fibrilleux-soyeux et un peu visqueux au début, blanc pur ou à peine un peu ochracé au centre, à cuticule se pelant typiquement en formant des morceaux triangulaire.


Zoom



### Chair

Chair blanche, ferme, assez épaisse.

Zoom



### Hyménophore

Lames échancrées, assez serrés, non libres et blanches. Souvent un peu rougeâtres par endroits, à arrête le plus souvent irrégulière, voir denticulée.

Zoom



### Pied

Pied de 4-11 x 1-3 cm, blanc, pelucheux avec la base parfois un peu radicante et souvent tachée de bleu.


Zoom



### Sans Anneau

Du texte


Zoom



### Sans Volve

Du texte

Zoom



# Tricholoma columbetta

## Tricholome colombette

**Ordre** : Agaricales      **Genre** : Tricholoma  
**Sporée** : Blanche

### Habitat

Sous feuillus, sur sol non calcaire.

### Comestibilité

Bon comestible.

### Période de cueillette

A partir du début de l'été et jusqu'à la fin de l'automne.

### Remarque

Chair avec une bonne odeur farineuses.

Risque de confusion avec *Amanita virosa* qui est mortelle. Mais aussi avec d'autres tricholomes blancs comme *Tricholoma album*; *Tricholoma albidum*; *Tricholoma stiparophyllum* (ex pseudoalbum) qui se distinguent notamment par des odeurs très différentes.